

Läkemedelsanvisningar inför planerad operation

Vid planerade operationer är det viktigt att undvika onödiga risker. Endel läkemedel kan ge en ökad blödningsbenägenhet och bör därför undvikas i samband med operation. Sådana läkemedel är framför allt de som innehåller acetylsalicylsyra (**ASA**) eller så kallad **NSAID**-preparat (nonsteroid anti-inflammatorisk drog).

Om Ni använder något av dessa nedanstående läkemedel skall Ni därför göra ett **uppehåll med detta i 7 dagar innan** planerad inläggning för operation på Neurokirurgen.

Acetylsalicylsyra	Ipren
Albyl minor	Ketoprofen
Alganex	Magnecyl
Alindrin	Meloxicam
Alka-Seltzer	Migpriv
Alpoxen	Mobic
Ardinex	Naprosyn
Arthrotec	Naproxen
Asasantin	Orudis
Aspirin	Perstantin
Bamyl	Piroxicam
Brexidol	Pronaxen
Brufen	Siduro
Clinoril	Toradol
Confortid	Tradil
Diclofenac	Treo
Diclofenak	Treo citrus
Eeze	Treo comp
Eox	Trombyl
Ibumetin	Voltaren
Indomee	Xefo

Äter Ni tablett **Waran** eller blodplätthämmande medel såsom: **Iscover, Plavix, Plefal, Ticlid** eller **Ticlopidine**, tag kontakt med oss för bedömning i varje enskilt fall.

Sannolikt är det säkrast att på samma sätt undvika nyare läkemedel såsom **Relifex** och coxiber preparat (cox-2-hämmare) såsom **Arcoxia, Bestra, Celebra, Dynastat** eller **Prexige**.

**Vid frågor kontakta Barbro Johansson, vårdplanerare.
Måndag - Torsdag kl. 13.00 - 14.30 Tele; 013- 22 28 41**