

TRUL – ultraljudsundersökning och eventuell mellannålsbiopsi av prostata

Undersökningen görs för att upptäcka sjukliga förändringar i prostata och för att mäta prostatakörtelns storlek.

I samband med undersökningen kan provtagning s k biopsi av prostatan utföras och detta skickas sedan för mikroskopisk undersökning. Undersökningen föregås ofta av att läkaren känner på prostata med ett finger i ändtarmen. Vid undersökningen förs en ultraljudsstav upp en kort bit i ändtarmen och prostatakörtelns storlek mäts. Vid provtagning förs en kanyl in i prostatakörteln, via instrumentet, och vävnadsprover/biopsier tas. Detta upplevs som ett lättare övergående obehag.

Undersökning med provtagning tar cirka 10 minuter men hela mottagningsbesöket tar cirka 30 minuter.

Förberedelser

Det krävs inga förberedelser utan ät och drick som vanligt.

Efter provtagningen

Det är vanligt med blod i urinen och blod från ändtarmen efter provtagning och även i sädesvätskan kan det finnas blod i flera veckor efteråt. Detta är ofarligt och upphör av sig själv. Försök dricka lite extra.

I enstaka fall kan man drabbas av hög feber och frossa efter provtagningen. Det är då viktigt att ta kontakt med akutmottagningen för kontroll och behandling.

Det tar cirka tre veckor innan svaret på proverna är klara och då blir du informerad. Ta gärna med en närstående vid detta återbesök. För att motverka infektion får du antibiotika i samband med provtagningen.

Viktigt

Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, kontakta den läkare/enhet som sköter din behandling.

Är du hjärtklaffopererad eller äter Waran, ta kontakt med Urologimottagningen innan besöket för att få besked om förebyggande åtgärder.