

(Om Koloskopi på persiska)

# کولوسکوپي يا مشاهده داخلي روده / نظريه اجمالی

## چگونگی معاینه

پیش از معاینه پماد بیحس کننده برای بیحس نمودن دهانه مقعد استفاده میشود. سپس بیمار بر روی تخت دراز کشیده و پزشک دستگاه کولوسکوپي را در مقعد فرو می برد.

لحظه فرو بردن لوله کولوسکوپي در بدن می تواند همراه با کمی درد یا ناراحتی باشد، لیکن چنانچه نیاز باشد دارو مسکن یا آرامش بخش داده میشود.

معاینه بین یک ربع تا یک ساعت طول میکشد.

## حالات پس از معاینه

پس از معاینه بدلیل هوایی که داخل بدن شده است میتواند احساس انقباض و ورم در شکم بوجود آید. همچنین میتوان احساس دل پیچه کردن داشت. زمانیکه هوای داخل شکم خالی شد ناراحتیها از بین میرود. پس از معاینه میتوان طبق معمول غذا و نوشیدنی مصرف کرد.

چنانچه برای انجام معاینه از داروی آرامش بخش استفاده شود باید تا یکی دو ساعت در بخش بستری شد. در چنین حالتی فردای روز معاینه هم حق رانندگی کردن را ندارید. بهتر است در روز معاینه شخصی را به همراه داشته باشید، ضمناً ممکن است نیاز به مرخصی روزانه نیز داشته باشید.

## اطلاعات عمومی

مفهوم کولوسکوپي معاینه روده بزرگ توسط شلنگی منحنی شکل است که نام آن کولوسکوپ میباشد. چنانچه فردی اسهال یا یبوست داشته باشد و یا در مدفوع خود خون ببیند لازم است این معاینه را انجام دهد. از طریق کولوسکوپي پزشک میتواند از بافتها آزمایش بعمل آورده و درمانهای مختلف را انجام دهد. معاینه کولوسکوپي برای مثال میتواند نمایانگر زخم یا غده در روده بزرگ و همچنین التهاب روده بزرگ باشد.

چنانچه شخصی مشکل قلبی یا ریوی دارد، همینطور اگر انسولین یا دارو جهت رفیق شدن خون استفاده مینماید، باید این مسئله را با پزشک معالج در میان بگذارد.

## آمادگی

قبل از معاینه باید به توسط تنقیه محتوی روده را تخلیه نمود. چنانچه داروهای حاوی مواد فیبر دار یا آهن دار استفاده میشود باید قبل از معاینه خوردن داروها را قطع نمود.

## درمورد 1177

با 1177 می توان شبانه روز هم از طریق اینترنت و هم بوسیله ی تلفن تماس گرفت.سایت www.1177.se که سایت مشترک لنزتینگ ومناطق مختلف کشور و به زبان سوندی است، ویژه ی اخبار و اطلاعات پزشکی- درمانی می باشد.جهت مشاوره و رایزنی با پرستار درمورد بیماری می توان به شماره ی 1177 تلفن زد.