

هكذا يتم أخذ اللقاح ضد كوفيد - ١٩ في Blekinge.

اللقاح ضد كوفيد-١٩ في Blekinge يتم على عدة مراحل تبعاً لأولوياتهئة الصحة العامة. الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية من التعرّض إلى الأمراض الخطيرة لهم الأولوية في أخذ اللقاح. اللقاح في Blekinge تم البدء فيه وسيستمر إلى صيف 2021. توفر اللقاح هو الذي يؤثر على سرعة وكيفية أخذ اللقاح. مما يعني أن الخطة الزمنية لأخذ اللقاح في إقليم Blekinge ممكن أن تتغير. عندما يحين دورك في أن تدعى لأخذ اللقاح سيعلمك إقليم Blekinge متى وكيف بإمكانك أن تحجز موعد لأخذ اللقاح.

خطة اللقاح الأولية

الفترة ١، كانون الأول-شباط

أفراد الفئات التالية تعطى اللقاح في فترة ١

- إذا كنت تقيم في سكن مخصص لكبار السن.
- إذا كان لديك خدمة منزلية حسب قانون الخدمات الإجتماعية.
- إذا كنت شخص بالغ وتقيم في نفس السكن مع شخص لديه خدمة منزلية.
- إذا كنت تعمل في سكن مخصص لكبار السن أو لأشخاص لديهم خدمة منزلية.
- لك الأولوية إذا كنت موظف في القطاع الصحي.

الفترة ٢، تبدأ في آذار

أفراد الفئات التالية تعطى اللقاح في فترة ٢

- إذا كنت بالغ و لديك إجراءات حسب قانون الدعم والخدمات لذوي الإحتياجات الخاصة (LSS) أو لديك حق في مساعد حسب قانون التأمينات الإجتماعية. اللقاح يعطى في المساكن المخصصة أو في المستوصف.
- إذا كنت ٦٥ أو أكبر. اللقاح يعطى في المستوصف.
- إذا كان لديك حالة طبية خاصة. مثلاً إذا تعرضت لعملية زراعة أعضاء أول غسيل كلوى، أو إذا كنت تقيم مع شخص لديه هذه الحالات. يعطى اللقاح في عيادة الأمراض المعدية في مشفى Blekinge أو في المستوصف.
- إذا كنت تعمل في قطاع الرعاية أو القطاع الصحي وتعمل على مقربة من الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية والعناية الطبية. اللقاح يعطى في مكان العمل.

الفترة ٣، تبدأ في نيسان
أفراد الفئات التالية تعطى اللقاح في فترة ٣

- إذا كنت بين ٦٠-٦٤ سنة
- إذا كنت ١٨ سنة أو أكبر ولديك مرض أو حالة تجعلك أكثر عرضة للإصابة الخطرة بكوفيد-١٩. على سبيل المثال أمراض القلب والشرابيين المزمنة أو متلازمة داون. هيئة الصحة العامة لديها معلومات في اللغة السويدية حول الأمراض والحالات المشمولة.
- إذا كان لسبب من من الأسباب لديك صعوبة في إتباع النصائح للحد من إنتشار عدوى كوفيد-١٩ هناك احتمالية أن تعطى اللقاح في قسم ملائم آخر.

الفترة ٤، تبدأ في نيسان- أيار

أفراد الفئات التالية تعطى اللقاح في فترة ٤

- الأشخاص الباقين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨-٥٩ والذين لا ينتمون إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة. يعطى اللقاح في المستوصف.