


واکسیناسیون در برابر عفونت معددهای و رودهای ایجاد شده بوسیله ویروس «روتا»



این دارو از راه دهان در دو نوبت
گوناگون و از سن شش هفتگی به
کودک داده می شود

اگر به راهنمایی و مشاوره نیاز داشته باشید با مرکز بهداشت
کودکان BVC تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر و خدمات برای شما و بهداشت و درمان کودک شما در
1177.se وجود دارد. برای دریافت مشاوره درمانی با شماره تلفن ۱۱۷۷
تماس بگیرید. در موارد اورژانس با شماره تلفن ۱۱۲ تماس بگیرید.



**پیش از آنکه فرزند شما واکسن روتاکس را دریافت نماید،
در صورتی که هر یک از موارد زیر در مورد او صدق کند،
مراتب را به پرستار یا پزشک اطلاع دهید:**

- هر نوع آلرژی/حساسیت شدید
- بروز مشکل پس از دریافت دوز قبلی روتاکس
- بیمار بودن و داشتن تب
- استفاده و یا شروع به استفاده از یک دارو، حتی داروهای بدون نسخه
- جدیداً واکسنی دیگر دریافت کرده باشد
- بدلیل مشکلات دستگاه گوارش مورد عمل جراحی، درمان یا معاینه قرار گرفته باشد
- مبتلا به نوعی بیماری است که مقاومت در برابر عفونت را کاهش می دهد
- ارتباطی نزدیک با یک عضو خانواده دارد که بعنوان نمونه سیستم ایمنی او تضعیف شده است، بعنوان مثال فردی که مبتلا به یک بیماری است و یا داروهایی استفاده می کند که سیستم ایمنی او را تضعیف می کنند.

بعد از واکسیناسیون

اگر در ساعات/روزهای اول پس از واکسیناسیون موردی غیر معمولی نزد فرزند خود مشاهده نمودید با پرستار در درمانگاه کودکان تماس بگیرید.

به همه کودکانی که در استان استکهلم سکونت دارند امکان واکسیناسیون رایگان در برابر عفونت ایجاد شده توسط ویروس روتا در درمانگاه کودکان، BVC داده می‌شود. این واکسن بین شش هفتگی و پنج ماهگی به کودک داده می‌شود. این واکسن از کودک در برابر عفونت‌های معده‌ای و روده‌ای که توسط ویروس روتا ایجاد می‌شود، محافظت می‌کند.

ویروس روتا چیست؟


ویروس روتا یک ویروس شایع است که در سراسر جهان انتشار یافته است. این ویروس دستگاه گوارش را آلوده می‌کند.

عفونت ویروس روتا چگونه خود را نزد کودکان

نشان می‌دهد؟

عفونت ویروس روتا معمولترین دلیل عفونت معده‌ای و روده‌ای نزد کودکان خردسال می‌باشد. این عفونت بسیار مُسری می‌باشد. بیشتر افراد در همان اوایل زندگی به آن مبتلا می‌شوند. می‌توان گفت که همه کودکان تا پیش از پنج سالگی یک عفونت ویروس روتا داشته‌اند. یک تا سه شبانه روز پس از آلوده شدن به این ویروس، معمولاً بطور ناگهانی استفراغ، تب و اسهال بسیار رقیق و با فواصل کم شروع می‌شود. استفراغ و/یا اسهال بمدت ۵ تا ۸ شبانه روز و در بعضی مواقع برای مدتی طولانی‌تر بدرازا می‌انجامد.

بعضی از کودکان شدیداً بیمار می‌شوند و این امر توأم با اسهال و استفراغ شدید می‌باشد که در بدترین حالت می‌تواند به آبزدایی، اختلالات نمک و املاح بدن، تشنج و مننژیت منجر شود. یک فرد می‌تواند چندین بار به این عفونت آلوده شده و بیمار شود اما اولین مورد بیماری همیشه سخت‌ترین آنها خواهد بود. عفونت‌های ویروس روتا در طول ماه‌های فوریه و مارس رایج‌تر است.



عفونت ویروس روتا چقدر خطرناک است؟

این عفونت کودکان مبتلا شده به آن و خانواده‌های آنها را تحت فشار زیادی قرار می‌دهد اما بیشتر بیماران بدون آنکه نیاز به درمان در بیمارستان داشته باشند، سلامت خود را باز می‌یابند. کودکان زیر دو سال ریسک بالاتری برای مبتلا شدن به عفونت جدی و عوارض ناشی از آن دارند. آسیب‌های پایدار به ندرت اتفاق می‌افتند. در سوئد مرگ و میر ناشی از این امر بسیار نادر است.

چه واکسنی در برابر عفونت ویروس روتا وجود دارد؟


نام واکسنی که به کودکان ارائه می‌شود روتایکس می‌باشد. این واکسن شامل ویروس ضعیف شده می‌باشد. کودک بعد از واکسیناسیون از طریق سیستم ایمنی بدن خود در برابر عفونت‌های جدی ایجاد شده از سوی روتا ویروس محافظت می‌شود. واکسن روتایکس Rotarix® در سال ۲۰۰۶ در اروپا معرفی شد و میلیون‌ها دوز از آن به افراد داده شده است. تاکنون ۸۰ کشور شروع به ارائه واکسیناسیون در برابر ویروس روتا نموده‌اند از جمله فنلاند، نروژ، بریتانیا، ایالت متحده آمریکا، آرژانتین، عراق، اردن، اتیوپی و آفریقای جنوبی.

واکسن ویروس روتا چگونه به فرد داده می‌شود؟

این واکسن از یک مایع تشکیل شده که در یک تیوب با درب فشاری قرار دارد. این مایع از شش هفتگی کودک بصورت دهانی در دو نوبت به او داده می‌شود. این واکسن حاوی ساکاروز بوده و طعم شیرین دارد. این واکسن بدون توجه به آنچه کودک خورده باشد، می‌تواند به او داده شود. اگر کودک واکسن دریافت کرده را مستقیماً از دهان بیرون ریخته یا آن را استفراغ کند، مستقیماً یک دوز جدید به او داده می‌شود.

چه زمانی روتایکس داده می‌شود؟

- دوز ۱ می‌تواند از شش هفتگی کودک داده شود.
- دوز ۲ حداقل یک ماه بعد از دریافت اولین دوز داده می‌شود. هر دو دوز بایستی ترجیحاً پیش از ۱۶ هفتگی کودک داده شود، اما این واکسن می‌تواند تا ۲۴ هفتگی دریافت گردد.
- کودکان نارس (بدنیا آمده پیش از موعد) و کودکان بدنیا آمده بعد از هفته ۲۷ بارداری، می‌توانند مطابق آنچه در بالا ذکر شد، واکسینه شوند. اولین دوز واکسن کودکانی که پیش از هفته ۳۲ بارداری بدنیا آمده‌اند و یادر هنگام تولد زیر ۱۵۰۰ گرم وزن داشته باشند، در بخش نئوناتال داده می‌شود.
- این واکسن می‌تواند همزمان با واکسن‌های دیگر در برنامه واکسیناسیون کودک گنجانده شود.



واکسیناسیون با روتایکس چه نوع محافظتی به فرد ارائه می‌دهد؟

این واکسن محافظت خوبی در برابر عفونت جدی ناشی از ویروس روتا بعمل می‌آورد.

عوارض جانبی ممکن کدامند؟

- عوارض تقریباً رایج برای کودکان اسهال، درد شکم، نفخ و جوش پوستی می‌باشد.
- یک عارضه بسیار نادر درون کشی روده (آخرین بخش روده باریک به داخل روده بزرگ رفته و انسداد روده بوجود می‌آید) می‌باشد. نشانه معمول این عارضه جیب‌های شدید نوزاد در فواصل معین می‌باشد که فاصله بین آنها کوتاهتر و کوتاهتر می‌شود. کودک ممکن است استفراغ کند. کودک رنگ پریده و بی‌رمق بوده و پریشان حواس بنظر می‌رسد. در هنگام بروز این نشانه‌ها کودک بایستی بلادرنگ به اورژانس مراجعه نماید. این انسداد روده معمولاً از طریق نوعی تنقیه که در بیمارستان انجام می‌گیرد، برطرف می‌شود.