

Ennen Rotarix®-rokotteen antamista lapsellesi, kerro sairaanhoitajalle tai lääkärille, jos

- lapsellasi on allergioita/yliherkkyyksiä
- lapsellasi on ollut ongelmia aiempien Rotarix®-annosten jälkeen
- lapsellasi on kuumetta
- lapsesi käyttää tai on äskettäin käyttänyt lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia
- lapsesi on äskettäin saanut jonkin toisen rokotteen
- lapsesi on leikattu tai häntä on hoidettu tai tutkittu jonkin vatsa- tai suolisto-ongelman takia
- lapsellasi on vastustuskykyä infektioita vastaan heikentävä sairaus
- lapsesi on läheisessä kontaktissa esim. perheenjäsenen, jolla on heikentynyt immuunipuolustus, esim. henkilöön, jonka sairaus tai lääkitys heikentää immunitettia.

Rokotuksen jälkeen

Ota yhteyttä neuvolan sairaanhoitajaan, jos huomaat lapsessasi jotakin epätavallista rokotuksen jälkeisenä aikana.

Ota yhteyttä BVC:n sairaanhoitajaan, kun tarvitset neuvoja ja tukea.

Osoitteesta 1177.se saat lisää tietoa omasta ja lapsesi terveydestä. Neuvoja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa numerosta 1177, akuuttitilanteissa soita 112.

1177
VÄRDGUIDEN

 Stockholms läns landsting

Finska


Tietoa vanhemmille

Rokote rotaviruksen aiheuttamaa vatsa- ja suolistoinfektiota vastaan



Annostellaan suuhun kahtena eri ajankohtana kuuden viikon ikäisestä alkaen

1177
VÄRDGUIDEN

 Stockholms läns landsting

Kaikille Tukholman läänissä asuville lapsille tarjotaan neuvoloissa (BVC) maksutonta rokotusta rotavirusinfektiota vastaan. Rokote annetaan 6 viikon – 5 kk:n ikäisenä. Rokote antaa lapsellesi suojan rotaviruksen aiheuttamia vatsa- ja suolistoinfektioita vastaan.


Mikä on rotavirus?

Rotavirus on yleisesti esiintyvä virus, joka on levinnyt kaikkialle maailmaan. Virus aiheuttaa tulehduksen vatsassa ja suolistossa.

Miten rotavirusinfektio ilmenee lapsella?

Rotavirusinfektio on tavallisin syy pienten lasten vakaaviin vatsa- ja suolistoinfektioihin. Se tarttuu hyvin helposti. Useimmat saavat tartunnan jo varhaisessa iässä. Lähes kaikki lapset saavat rotavirusinfektion viidenteen ikävuoteen mennessä. 1–3 vuorokauden kuluttua tartunnasta alkavat äkillinen oksentelu, kuume ja vetinen tiheä ripulointi. Oksentelu ja/tai ripulointi kestää noin 5–8 vuorokautta, joskus pidempään.

Osalla lapsista oksentelu ja ripulointi on hyvin voimakasta, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa kuivumiseen, suolatasapainon häiriintymiseen, kramppeihin ja aivotulehdukseen. Tartunnan voi saada ja infektiin sairastua useamman kerran mutta ensimmäinen kerta on taudinkuvaltaan rajuin. Rotavirusinfektiot ovat yleisimpiä helmi- ja maaliskuussa.



Miten vaarallinen rotavirusinfektio on?

Infektio on raskas sekä sairastuneille lapsille että heidän perheilleen mutta useimmat paranevat siitä ilman sairaalahoitoa. Alle 2-vuotiailla lapsilla on suurin riski saada vakava infektio komplikaatioineen. Pysyvät vahingot ovat harvinaisia. Kuolintapaukset ovat Ruotsissa erittäin harvinaisia.

Mitä rokotetta rotavirusinfektiota vastaan tarjotaan?


Tarjottava rokotteen nimi on Rotarix®. Se sisältää heikennettyjä viruksia. Elimistön oman puolustusjärjestelmän kautta lapsi saa rokotuksen jälkeen suojan vakavaa rotavirusinfektiota vastaan. Rotarix® otettiin Euroopassa käyttöön vuonna 2006, ja sitä on annettu jo miljoonia annoksia. Tähän mennessä yleiset rokotukset rotavirusta vastaan on aloitettu jo 80 maassa, muun muassa Suomessa, Norjassa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Argentiinassa, Irakissa, Jordaniassa, Etiopiassa ja Etelä-Afrikassa.

Miten rotavirusrokote annetaan?

Rokote koostuu liuoksesta, joka on putkilossa. Rokote annetaan suun kautta kahdella eri kerralla kuuden viikon iästä alkaen. Rokote sisältää sokereita ja maistuu makealle. Se voidaan antaa riippumatta siitä, mitä lapsi on syönyt. Jos lapsi sylkäisee tai pulauttaa rokotteen saman tien, annetaan heti uusi annos.

Milloin Rotarix® annetaan?

- Ensimmäinen annos voidaan antaa 6 viikon ikäisestä lähtien.
- Toinen annos annetaan vähintään kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Molemmat annokset tulee antaa mieluiten 16 viikon ikään mennessä, mutta rokotteen voidaan antaa vielä 24 viikon ikään mennessäkin.
- Keskokset, jotka ovat syntyneet 27. raskausviikon jälkeen, voidaan rokottaa kuten edellä. Ensimmäinen rokotteen annos ennen 32. raskausviikkoa syntyneille lapsille tai lapsille, joiden syntymäpaino on alle 1500 g, annetaan vastasyntyneiden osastolla.
- Rokotteen voidaan antaa samanaikaisesti muiden lapsen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteen kanssa.



Minkälaisen suojan Rotarix®-rokote antaa?

Rokote antaa hyvän suojan vakavaa rotavirusinfektiota vastaan.

Mitä sivuvaikutuksia voi ilmetä?

- *Melko tavallisia oireita* lapsella ovat ripuli, vatsakipu, ilmavaivat ja ihottuma.
- *Erittäin harvinaisen* sivuvaikutus on suolentuppeuma (ohutsuolen pää työntyy paksusuolen sisään, jolloin suoli tukkeutuu). Tyypillisiä oireita siitä ovat kovat toistuvat, tihenevät kipukohtaukset. Lapsi voi myös oksentaa. Lapsi on kalpea, voimaton ja poissaoleva. Näiden oireiden ilmaantuessa lapsi on vietävä heti päivystysvastaanotolle. Tuppeuma saadaan tavallisesti hoidettua sairaalassa annettavalla peräruiskeella.