

### 在你的孩子服用Rotarix®前请将孩子的以下情况告诉医生或护士：

- 对某物过敏/过度敏感
- 在服用了上一剂Rotarix®后出现了问题
- 发烧生病
- 正在或刚服用过药，包括非处方药
- 最近刚接受过其它疫苗
- 因肠胃道而被开过刀、接受过治疗或被做过检查
- 得过使得抗感染能力下降的病
- 和如免疫系统被弱化的家庭成员有亲密接触，比如该人带有或服用使得免疫系统弱化的疾病或药物。

### 服用了该疫苗后

在服用该疫苗后的最近一段时间内如果你注意到了孩子有某些地方不同寻常时请和儿童护理中心的护士联系。

若您需要咨询或协助，  
也请与孩童保健中心的护士联系。

请上1177.se了解关于为您与子女所提供医疗、  
健康与保健服务的进一步信息。  
欢迎来电1177听取医疗保健咨询服务。  
如遇紧急状况，请来电112。

**1177**  
VÅRDGUIDEN

 Stockholms läns landsting

Kinesiska

给家长的信息

## 给孩子服用预防轮状病毒 引起的肠胃道感染的疫苗



自孩童出生后6星期起，  
以口服方式分2次服用。

**1177**  
VÅRDGUIDEN

 Stockholms läns landsting

住在斯德哥尔摩省的所有孩子可在儿童护理中心（BVC）得到免费的预防轮状病毒感染的疫苗。儿童在6周到5个月大时服用该疫苗。该疫苗保护你的孩子不受轮状病毒引起的肠胃道感染。


## 什么是轮状病毒？

轮状病毒是分布全球的常见病毒。该病毒感染肠胃道。

## 孩子受轮状病毒感染后有什么表现？

轮状病毒是小孩得严重肠胃道感染的最常见原因。它的传染性很强。大多数人很早就感染了该病毒。几乎所有孩子在满5周岁前就感染了轮状病毒。一般在被感染后三到五天突然出现呕吐、发烧以及频繁而且如水一样稀的腹泻。呕吐和/或腹泻一般会进行5-8天，有时更长。

一些孩子生病很严重，大量呕吐和腹泻。最严重时会引起脱水、体内盐度失衡、痉挛和脑炎。一个人一生中可以多次受感染，但是第一次最严重。轮状病毒感染在2月份和3月份最常见。



## 轮状病毒感染有多危险？

轮状病毒感染会给孩子和他们的家庭带来很大痛苦，但是绝大多数人无需医疗就会康复。不到两岁的孩子最可能被严重感染并带并发症。后遗症很少见。在瑞典，它引起的死亡极其少见。

## 我们提供的对付轮状病毒感染的疫苗是哪种？


我们提供的疫苗叫Rotarix®。它含有弱化的病毒。孩子将在服用了该疫苗后会通过自身的防护机制产生对轮状病毒感染的免疫力。Rotarix®在2006年投放欧洲，已经投放了数百万计的剂量。目前为止有80个国家实施了全民轮状病毒免疫，其中有芬兰、挪威、英国、美国、阿根廷、伊拉克、约旦、俄罗斯、塞内加尔和南非。

## 如何使用轮状病毒疫苗？

疫苗以药水形式装在可以挤出的软管里。从孩子满6周起分两次滴入孩子嘴里。该疫苗含有蔗糖，所以是甜的。给孩子服用时不需考虑他们是否吃过东西。如果孩子刚服用就将它吐出后呕吐出，请立刻再给他/她一剂。

## 何时给孩子服用Rotarix®？

- 第一剂在孩子6周后给。
- 第二剂在第一剂之后至少一个月后再给。这两剂最好在孩子满16周前给。但是可以给孩子满24周。
- 产于第27周以后的早产儿可以如上给予服用疫苗。早于第32周出生的早产儿或出生体重不到1500克的孩子服用该疫苗应在新生儿特别护理部进行
- 该疫苗可和儿童免疫计划规定的其它疫苗同时进行。



## 服用Rotarix®疫苗会带来哪种保护作用？

该疫苗可以有效防止严重的轮状病毒感染。

## 会发生什么副作用？

- 比较常见的是孩子会有腹泻、腹痛、肠气以及皮疹。
- 一个非常罕见的副作用是肠套叠（小肠的最后部分被挤压进了大肠，导致肠阻塞）。典型症状是孩子间歇性竭力哭喊，间隙越来越短。孩子会呕吐。孩子肤色发白、受惊吓、好象不理睬人。出现这些症状时请立刻去急诊。该种肠阻塞一般通过在医院做一种灌肠来解决。