

แจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบ ก่อนที่บุตรของคุณจะ ได้รับวัคซีนโรคทริคัลส์ ถัดเด็ก:

- มีอาการแพ้/การแพ้ง่ายต่ออะไรก็ตามแล้วแต่
- เคยมีปัญหาหลังจากการได้รับวัคซีนโรคทริคัลส์ครั้งแรก
- มีไข้ไม่สบาย
- ได้รับหรือเพิ่งได้รับยาบางอย่าง แม้แต่ยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
- เพิ่งได้รับวัคซีนอย่างอื่นไปใหม่ๆ
- ได้รับการผ่าตัด การรักษา หรือการตรวจเนื่องจากปัญหาของกระเพาะอาหาร และลำไส้
- มีโรคที่ทำให้ความต้านทานโรคน้อยลง
- มีการอยู่ใกล้ชิดกับ ตัวอย่างเช่น สมาชิกในครอบครัวที่มีระบบความต้านทานน้อย เช่น คนที่มีโรค หรือได้รับยาที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำลง

หลังการได้รับวัคซีน

ให้ติดต่อพยาบาลที่สถานเฝ้าระวังเด็ก ถ้าคุณสังเกตเห็นว่ามีอะไรที่ไม่ปกติในเด็กหลังจากได้รับวัคซีนไปใหม่ๆ

หากคุณต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือ ให้ติดต่อพยาบาลของคุณที่ศูนย์อนามัยเด็ก

ข้อมูลและบริการเพิ่มเติมสำหรับคุณ และสำหรับสุขภาพและการรักษาพยาบาลของบุตรของคุณ มีที่เว็บไซต์ 1177.se โทร 1177 เพื่อรับคำแนะนำเรื่องการรักษาพยาบาล กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน โทร 112

1177
VÅRDGUIDEN

 Stockholms läns landsting

Thailändska


ข้อมูลสำหรับบิดามารดา

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส โรต้าของกระเพาะและลำไส้



หยุดให้ทางปาก ห่างกันสองสัปดาห์
เริ่มได้ตั้งแต่อายุหกสัปดาห์

1177
VÅRDGUIDEN

 Stockholms läns landsting

เด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในมณฑลสต็อกโฮล์มได้รับการเสนอวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าให้ที่สถานอนามัยเด็กโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่าย วัคซีนนี้จะให้ในเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 อาทิตย์ถึง 5 เดือน วัคซีนนี้จะช่วยป้องกันบุตรของคุณจากการติดเชื้อไวรัสโรต้าในกระเพาะอาหารและลำไส้


ไวรัสโรต้าคืออะไร?

ไวรัสโรต้า เป็นไวรัสที่เจอกันทั่วไปและแพร่กระจายไปทั่วโลก ไวรัสนี้จะทำให้เกิดการติดเชื้อตามทางเดินของกระเพาะอาหารและลำไส้

การติดเชื้อไวรัสโรต้าในเด็กจะทำให้เกิดอาการอย่างไร?

การติดเชื้อของไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงทางกระเพาะอาหารและลำไส้ในเด็กบ่อยมาก และมันจะคิดกันได้ง่ายมาก ส่วนใหญ่ติดเชื้อกันมาตั้งแต่ตอนเล็กๆ เด็กทั้งหมดมีเชื้อไวรัสโรต้าตั้งแต่ก่อนอายุ 5 ปี หลังจากติดเชื้อ 1-3 วันก็จะมีการอาเจียน มีไข้ ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำบ่อยครั้ง ติดๆกัน อย่างเฉียบพลัน การอาเจียนและ/หรือการที่มีท้องเสียจะเป็นอยู่ประมาณ 5-8 วัน บางครั้งก็นานกว่านั้น

เด็กส่วนหนึ่งจะมีอาการรุนแรง อาเจียนและท้องเสียอย่างมาก ในรายที่แย่มากๆอาจนำไปสู่อาการขาดน้ำ ขาดความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย ชัก และมีการอักเสบของสมองได้ แต่แต่ละคนอาจจะติดเชื้อและล้มป่วยได้หลายครั้งแต่จะมีอาการหนักมากในครั้งแรก การติดเชื้อไวรัสโรต้าจะมีบ่อยมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม



การติดเชื้อไวรัสโรต้าจะอันตรายแค่ไหน?

การติดเชื้อทำให้เด็กและครอบครัวของเขามีความลำบากยุ่งยาก แต่ส่วนใหญ่หายเองโดยไม่ต้องเข้าอนพักรักษาในโรงพยาบาล เด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบจะมีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อที่มีอาการแทรกซ้อนสูง ไม่มีอาการหรือปัญหาหกล้างอย่างถาวรเมื่อหายจากการติดเชื้อแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ปกติในการที่จะมีการตายจากการติดเชื้อนี้ที่สวีเดน

วัคซีนอะไรที่เสนอให้เพื่อป้องกันการติดเชื้อของไวรัสโรต้า?


วัคซีนที่เสนอให้ชื่อ โรตาริกซ์ มันมีส่วนผสมของไวรัสที่ได้ทำให้อ่อนแรงลง จากขบวนการต่อสู้เพื่อป้องกันร่างกาย ทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไวรัสโรต้าที่รุนแรงเกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีน วัคซีนโรตาริกซ์ได้ถูกนำเข้ามาในยุโรปปี 2006 และมีผู้ได้รับเป็นล้านราย จนถึงบัดนี้มี 80 ประเทศที่จัดให้การให้วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้ารวมอยู่ในการให้วัคซีนทั่วไป ตัวอย่างเช่น ประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ อังกฤษ อเมริกา อาร์เจนตินา อีริค จอร์แดน เอธิโอเปียและแอฟริกาใต้

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโรต้าให้ได้อย่างไร?

วัคซีนนี้เป็นของเหลวที่บรรจุในหลอดที่มีบีบได้ ให้ทางปากสองวาระ เริ่มตอนอายุ 6 อาทิตย์ วัคซีนนี้ประกอบด้วยน้ำตาลซูโครสและมิลีสมหาสามารถให้ได้ไม่ว่าเด็กกำลังได้รับอะไรเป็นอาหาร ถ้าเด็กบ้วนทิ้งหรืออาเจียนออกทันทีหลังจากได้รับ ก็ให้ใหม่ได้ทันที

จะให้วัคซีนโรตาริกซ์ เมื่อไหร่?

- ครั้งที่ 1 สามารถให้ได้ตั้งแต่อายุ 6 อาทิตย์
- ครั้งที่ 2 ให้หลังจากได้รับครั้งแรกอย่างน้อย 1 เดือน การให้วัคซีนทั้งสองครั้ง ถ้าเป็นไปได้ควรให้ก่อนอายุ 16 อาทิตย์ แต่ก็สามารถให้ได้จนกระทั่งถึงอายุ 24 อาทิตย์
- เด็กที่เกิดก่อนกำหนด เกิดหลังการตั้งครรภ์อาทิตย์ที่ 27 สามารถให้วัคซีนได้ตามที่บ่งไว้ข้างบน การให้วัคซีนครั้งแรกในเด็กที่เกิดก่อนอายุอาทิตย์ที่ 32 หรือ มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1500 กรัม ให้ที่คลินิกเด็กทารก
- วัคซีนนี้สามารถให้พร้อมกับวัคซีนอื่นๆตามโปรแกรมการให้วัคซีนในเด็ก



วัคซีนโรตาริกซ์ ป้องกันอะไรบ้าง?

วัคซีนนี้ป้องกันการติดเชื้ออย่างรุนแรงของไวรัสโรต้าได้

มีฤทธิ์ข้างเคียงอะไรได้บ้าง?

- ที่เจอบ่อย คือ ท้องเสีย ปวดท้อง ผายลม และมีผื่น
- อาการข้างเคียงที่อาจเจอได้แต่น้อยมาก คือการอุดตันของลำไส้ เนื่องจากส่วนสุดท้ายของลำไส้เล็กถูกกดให้เข้าไปซ่อนอยู่ในลำไส้ใหญ่ อาการเฉพาะที่บอกได้คือการแผ่ร่องเป็นระยะๆของเด็ก และจะบ่อยขึ้นๆ เด็กอาจจะอาเจียน ชิด อาการมากขึ้นจนราวกับว่าไม่รู้สีกตัว ถ้ามีอาการเหล่านี้ จะต้องพาไปแผนกฉุกเฉินทันที อาการอุดตันที่ว่า ตามปกติแก้ไขได้โดยการสวนอุจจาระซึ่งต้องทำในโรงพยาบาล